



產科指南卷上畢

妊娠腹滿大便燥者二宜



右為末糊丸每服一錢白湯送下

蕎麥西一大黃西三

朱明丸

右搗以白密二合和服如豆

甘遂西二

者甘遂散下之

療妊娠子淋大小便並不利氣急服諸苓散不差

外臺甘遂散

生地黃汁和代赭石末服方寸匕

又方



赤小豆為末好酒服方寸匕日二度

又方治姙娠數月經尚來者

十

丹參舶來物ヲ用ユハシ和產疑ハシキ物

治姙娠胎墮下血不止方

丹參四十以好酒五升煮取三升分三服

千金方

予按鯉魚能利蓄水故可令服之

療姙娠數月傷胎者

中頗三過作効安穩無忌



右如法作腫少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月

鯉魚斤二 粳米升一

外臺秘要方

吐血衄血者二洞當飲一兼用又

右熱湯擺出ノ用二方黃栢一 姜丁

川芎 黃芩 黃連各一 大黃分五

龍騰飲

三日此湯ヲ以龍騰飲ヲ兼用速ニ愈二

一婦人妊ニ微寒熱血ニ齟リ逆出ノ不止

所ナリ龍騰飲兼用ノ宜



吐血衄血卒胸痛者是盛奴而其氣暴逆ノ得ル

石水煎服

皮各五  
甘艸分一  
芍藥各一

柴胡 黃芩 黃連 茯苓 半夏 生姜 青

洞當飲

此方二宜之

者二宜之 又妊陰門兩邊赤腫者ハ針ヲ忌

煩燥口渴浮腫有熱而大便秘之或ハ四肢麻痺

生薑一 右水煎服

麻黃 大棗 蒼朮 石膏 甘艸 日



龍翔飲

他急証十者宜服

治水腫及脚氣小便不利諸藥無效者心下不滿

仲少 右水煎

冬葵子二 商陸二 猪苓二 杜仲二 甘

赤小豆二 炒五 沈香二 木通二 木瓜二 澤瀉

禹水湯

攪化頓服

右先以水二合煎直根人參至一合去滓內熊膽

熊膽五上 直根人參二



熊參湯 治子癰

右水二合煎一合服

人參一直根黃連五

浸連湯 治子癰

治姙娠嘔吐不止者

右為丸或水煎服或加附子

乾姜 人參 一直根 兩各 半夏 兩二 生地黃 少

乾姜 人參 半夏 丸

香或加附子

姙娠惡阻心下滿嘔吐者二宜之或加丁香



伏龍肝汁煎服

半夏變八 茯苓變四 青皮變一 生姜變一

虎翼飲

按又凡二姓娠氣心腹不和而痛者二宜之

治又

暈嘔吐往來寒熱無問產前產後一切氣滯皆

助小腹中結塊發渴刺因之不調或入眩

婦人一切諸氣作痛或上湊心胸或攻築脇

有效

甘艸少 右水煎熱服又加沈香大腹皮當飯尤



半六  
分各

姜乾

紫蘂

陳皮

半一  
姜

烏藥

香附子

正氣天香湯

陳皮為六君子湯用二或八加炮姜附子用二

用二此方治胎二如孕胎二如附子成難食化作酸屬虛

火者二宜二又孕胎二如死胎二成難食化作酸屬虛

脾胃元氣虛弱飲食少思又飲食難化作酸屬虛

右姜棗水煎

人參 白朮 扶苓 甘艸

四君子湯

于氣和入八則痛自止



溫補ノ劑ヲ服ノ藥反テ膈ニ泥ム者此湯ヲ以

痛冷者久ク小建中湯或ハ桂枝加附子湯等ノ

此方胎腹不和ノ者ニ宜シ若シ寒シ邪腹ニ入

腹虚冷者加附子

麥芽 氣惱加烏藥香附 身冷寒汗加桂枝

黃芩 嘔吐加砂仁半夏 傷食加山楂子香附

腹痛如木香附 咳嗽加桑白朮穀 腹熱加

痛及胎前諸疾此方ニ依テ加減ス入

子懸者心胃脹痛ナリ兼胎氣不和心腹脹滿疼

大腹皮 甘草 右生姜水煎



當歸 川芎 白芍 參 紫蘇 陳皮

藥酒

紫蘇和氣飲

難堪者亦宜

診脉ノ量ル又頭甚者又肩背強リ甚シ  
見ル動ル人事ヲ不知呼吸如絶更ニ聲ナキハ  
癰甚者角弓反張シ左脇下鉄棒ノ如キモ  
常日夜暗者等皆宜シ又產後不語者ニ宜シ又  
兒夜啼不止身冷者或ハ瘦弱者又產後眼目如  
不止或ハ身冷者白帶下或ハ大人小兒目小  
ハ乳房堅痛乳汁不通或ハ月水不順或ハ崩漏



或夜夢驚或八夜不眠或八手足指麻痺或

或痛三身乍寒乍熱或八自盜汗或八欠數

氣鬱ノ眩暈頭痛背強リ心胸動氣下痞

驗ルコト口左ノ如シ

用ヒテ効アリ產後ノ肥立モ甚ヨ口之其他經

ル方ナリ平生癰証アリ者臨ニ催生ニ替ハ

此方產前產後氏ニ用テ随ニ用テヤト

薑蠶各一獨活各四右水煎服

半夏各三附子各五甘草少當歸

沈香 益智 川烏頭各二天麻 防風



沈香天麻湯

活入腹冷者八更二加附子

又每孕死胎隨者早本方二加何膠半夏用

治妊氣血不足又產後怔忡氣血虛驚恐者

均藥分各甘艸右水煎服

人參白朮當飯茯苓川芎生乾地黃

八珍湯

隨入者八加阿膠半夏

不止者如神丸兼用有効又每孕胎死

右水煎服產前後大便下利腹冷者二宜之如



扶苓 芍藥 生姜 白朮 各三 附子 分二

真武湯

湯ヲ用ルハ活メシ

盜汗者ヲ治メ又毎ニ死胎ヲ産メ者此

ハ如阿膠大 半夏中 産前後氣血虛寒熱自汗

茯苓 桂枝 各五 右水煎服但胎隨メ症ニ

白朮 黃芩 芍藥 各一 乾薑 川芎

第一和劑湯

ナ

櫛八次ナリ和製ノ炒メ豆粒ノ如キ者ハ効



阿膠二 阿膠二 數品ヲリ 硯様又玉様ハ上品ナリ

遙散加山施子阿膠邪解テ後宜服前方接又

腹冷者加附子又外邪身熱或ハ寒熱汗出者道

阿膠<sup>三</sup> 右水煎服 治每孕二三月必隨胎者

當歸 生<sup>三</sup> 芍藥<sup>二</sup> 川芎<sup>半一</sup> 艾葉<sup>分三</sup>

膠艾四物湯

シク此方ヲ服スヘシ

中リテ身熱スル者ハ腎氣圓應セザルハ宜

小便不利ノ腎氣圓應スル症ト雖ト風邪ニ

治小便不利腫滿身熱者 若シ先ニ身冷腫滿



右水煎服或加車前子

猪苓 猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石 分各等

猪苓湯

治妊娠轉胞腫滿小便不利身冷者

附子 分八 右水煎服

車前子 分五 山藥 分五 牡丹皮 分三 山茱萸 分三

地黃 錢一 茯苓 錢五 牛膝 分八 桂枝 錢一 澤瀉 錢一

加味腎氣圓

每孕胎死腹中者胎養比活又

胎動下血或八水下ル子離氏子膜不破者又



血發熱者治之治之加縮砂王可胎動腹痛或八下

右姜水煎服胎倦惡食或八下

阿膠各等阿膠者八生芩宜下地榆

川芎芍藥半夏甘艸當歸

白朮扶苓黃芪

安胎湯

腹冷者加何膠附子二宜之

凡者二宜之又臟弱孕每二死胎二及之者

右水煎服產前後寒涼二中リ腹痛拘急

膠飴

三



生薑

芍藥

枚十

大棗

甘草

桂枝

小建中湯或加附子

又臨身冷者宜之

者二宜之腹痛者下之又重者痛々々難キ

右水煎服姪娠寒涼二中リ胎悶腹痛入ル

枚一附子

生薑

甘草

芍藥

桂枝

桂枝加附子湯

八証二隨之

藥附子湯只氣弱者八四君子湯或ハ附子ヲ加フ餘



凡臨產元氣常ノ如クニ只身冷ル者ハ桂枝加芍  
 ル者アリ然レ氏産後ニハ破血ノ劑良トスハ  
 之強テ用ユレハ氣血ヲ動カシ後ニ寒熱汗渴ヲ發  
 仁大黃芒硝等ノ破血ノ劑ヲ投スル者下リ忌ム挑  
 臨產ノ者二一に向催生ノ爲ト思ヒ故ナク壯皮桃  
 若シ餘証ノアル者ハ其証ニ隨テ方ヲ施スハ又  
 ヲ察メ証ニ隨ヒ方ヲ處スハ應シ方ニ時ハ安産ス  
 吾カ門ニ催生ト定タル方ナシ只臨産ハ虛實冷熱  
 臨産ノ者ニ古來ヨリ催生ト稱ス方下リ雖氏

## 經方

二十六首



下得夕ルモナリ

産論ヲ熟讀スルニ數百遍ニ思專精ニ

術熟々ル者深シ參考ス入シ予ハ師授ナクシテ只

ハ術ヲ以テ皆逆産ノ狀ニ作テ出ス術ナリ因テ他

雖氏圃生ノ術ハ横産ニノ頂産明ニ趣力ザル者

凡回生ノ術ハ神奥ニ及メ未熟ノ所ニ非ズ然ト

テ後ニ初テ其術ヲ傳ルナリ

予モ亦門人ニ先ヅ他ノ諸術ヲ教ヘ歎ミ得セシメ



及ノ所ニ非入トテ口授ニ傳ハ來リシトアリ故ニ  
子玄氏先生回生鉤胞ノ術ハ究テ神奧ニノ筆墨ノ  
回生鉤胞術

シ故ニ熟術ノ者ニ口傳スルノ三  
施セハ出產有ヘシ尤モ書記スモ初心ノ者ニ者得難  
ヲ活スヘシ假令母子俱ニ死スモ離氏此術ヲ以テ  
腹中ニ動テ命アルハ急ニ一生ノ術ヲ以テ出シ兒  
臨產未タ兒出ス又ニ母急ニ惡証ヲ發メ忽チ死シ兒  
母死活兒術  
「アラレテ恐ヘキニ足ラヌ



一 啼聲ノルハ奇ナリ故ニ治方ナシト雖氏止ム

リ 悶ノヲナストイハ氏啼聲ヲモカス然ルニ萬

ハ 之按姪虚冷者腹熱或痘熱疹熱ノ毒ニ中

レ ヲ信セヌ胎腹中ニ啼聲アリ雖氏自ラ止ム

周西按前文曠園種志ト虞氏正傳ノ二說予ハコ

奇予昔聞先慈言予亦在先慈腹中作聲者數次

拾物使兒復得令入口中即止柴乃用此術耳不足爲

姪婦登高取物脫出兒口以此作聲令姪婦曲腰向地

而聲止按虞氏正傳云臍帶上无瘡乃兒口中含者因

於地令入掖婦逐一拾起納盒中逾時拾至三十三枚



驚恐味坐定審視良久顧座間有象棋一壺隨手散傾  
栢署栢因囑往視見婦極委頓而腹中作聲不止舉家  
月腹中忽忽作聲一時喧傳杭州有柴北溟善醫客  
云康熙三十八年栢某分巡江西有胥役吳敬婦懷八  
外又後廢帝元徽中車莞徐垣妻懷孕亦然曠園雜志  
啼聲宋孝武大明中張暢妾懷孕而干腹中啼聲聞于  
醫賸曰玉芝堂談薈云雞跖集王曇母孕時腹中聞  
文左二出又

ノ醫賸二其說下リ因テ始テ是ヲ明メ得タリ今其  
止ナリ予甚其理ヲ疑フ然ルニ二醫官多紀機藝先生

ル其聲呼吸ノ音ナシ但發音ノ三是亦藥治ナク自  
二又予力知ル所ノ農家ノ妻姪ヲ十月然ル者ヲ見  
恙ナシ其人今年六十四歲予聞テコレヲ疑フ然ル  
聲アリ藥治ナク自止ム同月下旬安産ノ母子俱ニ  
隣家ヨリ嫁リ嫁ス姪十二月ニ母ノ腹内ニ於テ啼  
予力本科ノ師木更津山玄門君ノ妻其母ハ予力  
兒啼母腹中說

オヨリ三月忌ムハ卒ニ崩漏ノ疾ヲ患ルナリ  
大ナル戒トス又産後房事ヲ忌ムト健婦トイヘ  
凡産前多房ノ者ハ産後羸弱ヲ病ヘ此姪中ノ



忌房事說

ムハシ慎ムハシ  
ナカラ危シ譬ハ過テ瘡ヲ敗テ膿ヲ漏ルカ如シ慎  
或ハ鬱冒シ或ハ角弓反張メ諸惡証ヲ發ス十二  
此眞ノ敗血ニシテ若シ上衝スハ血暈シ氣急シ  
移入經水獨リ專ラ流受ル所ナク氣血ヲ散亂ス  
ハ未タ熟セ又シ強テ傷リ胞衣ヲ放ツ故ニ母ヨリ  
ニ達シ努力ヲナス「臨産ノ本位ナリ然ルニ半産  
巡リ靜ニ兒モ亦下ハ進ミ安ク故ニ陣疼自ラ下  
リ乳汁トナルハシ故ニ胞膜離ルトイヘ氏血氣ノ

二ヲ離レ胎ニ移ス經水モ亦自然ト止テ變シテ上  
分熟シテ催シテ催シテ胎衣腰服ハ鬱ノ違ニ着所自然天理  
二危シテ恐ルハ慎ムハ按スル二本産ハ時刻十  
ノ三種急ニ傷ルハ半産ハ是ヲ本ニ産比スル坐藥  
墮胎ノ坐藥ヲ用ヒテ半産スルヲ顛外打撲坐藥  
二テ胎轉動シ胞膜傷レテ半産スルヲ或ハ好テ  
テ半産スルヲ又身ヲ顛臥スルカ或ハ打撲ノ類  
ルヲ又一ノ病ヲ發テ其毒ニ傷ラレ死胎トナリ  
凡半産スル者ニ必ス故テ死胎ニナリ半産ス

半產說



玄了先生ノ名術ニ歟ハ萬代不朽ノ大法ナリ  
俱ニ堅固ニ臨テ致シ其位ニ安シタル時ハ胎  
常ニ相離レ又様ニ致シ其位ニ安シタル時ハ胎  
術ヲ盡シ胎ノ督脉ト母ノ任脉トメ重子相合テ  
シ整胎ノ術ニ及テハ先腹ノ狀ヲ探リ胎ノ否ヲ知リ  
子宮ノ口邊ハ兩足ノ踵ノ尖ヲ垂レ居ルハ凡  
居ルト謂ルヲ始テ知ルナリ又逆孕ハ横骨ノ中  
ル時ノ様ニ似タリ其女是ヲ探得テ大ニ驚キ倒ニ  
ル丸ヲ指頭ニコリツク其様已ニ生レ出スト欲ス  
メ子宮ノ口邊ヲ探ラシムルニ九月後ハ兒ノ頭堅

サト入其法姓婦自身ノ指二本陰戸ノ中へ入サシ  
疑テ居ル子モ亦如何セシト按シ術ヲ替テ其女二  
面人愚ナル女アリテ數度サトセテ其得ルナク  
俗婦人自身安難ヲ知ル大ナル益ナリ然ル一二  
里ニ姓アリハ此ヲ曉スニ得ル者多シ此後世ノ  
メ但他人ノ術ト異ナル三術ノ意味ハ同シ予ガ  
ニナルナリ其術ト謂ルモハ此書ニ有ル術ニ  
兒ノ頭明カニ見入ルナリ而シテ整胎ノ術モ自身  
ヲ横骨ノ上ノ際任脈ノ下ヲ深ク推動カシ見レハ  
仰臥シ左右ノ手ノ中指ノ頭ヲ小腹ノ下左右ハ當



欲入者八九月後二及ヒ我身ヲ前二入ハル様ニ  
ノ癖言ナリ又姓婦自身ニ腹中ヲ探リ否ヲ悟ソト  
明力ナリ逆孕ハコ二反入只試入シテ疑者大俗  
シ見レバ順孕ノ者ハ胎頂丸ク堅ク指ニ應スル  
任脉ヲタタカリ腹中ヲ深ク推シ擱ム様ニ動カ  
メ小腹ノ下横骨ノ上ノ際<sup>キ</sup>ヲ醫右ノ手ノ指ヲ導テ  
及テ姓婦ヲ帶ヲ解シメ仰<sup>キ</sup>臥セシメ両足ヲ屈セシ  
此道ヲ學ヒ試シト欲セバ初心ノ者ハ九月臨月ニ  
ルトアリ予又按スルニ學ハ入メ疑者ハ俗ナリ先  
暗ニ符合スル故ニ彼笑タルノ大謬ナリ事ヲ知

產科ノ書ニ元ヨリ倒首ニ定ム其言子女子ノ說ト  
書ニ又曰後長洲譯官猶林氏所藏ノ諸厄利亞國ノ  
ノ居ルト謂ル說ヲ妄言ナリト大ニ笑ヘリ然氏其  
ルニ其言ニ產論ノ胎腹中ニ有テ始ヨリ首ヲ倒ニ  
及ヌト發明スル名家ナリ然ルニ解體新書ヲ覽  
ニ於ケル實ニ我邦及唐土ノ諸名醫ト雖氏未聞  
シト此一條ハ古今未幾ノ確論ニ賀川氏ノ此科  
月ニ至テ此ヲ按テ其體貌ヲ別テ而盡ストヲ得ヘ  
背面ノ首ヲ倒ニス其頂横骨ノ上際ニ當テ居リ臨  
產論曰腹中ノ胎大抵五月ノ後大サ瓜ノ如ク必ス



背面倒首論

シ圖ニシテ下ノ卷ニアリ  
ク出ル者ハ表裏反ラヌ其ハ出ルモアリ定リナ  
先ニ兒出ル時臍帶ヲ引テ出レハナリ又胞自ラ安  
凡胞膜出ルニ腹ニ於テ裏反リテ出ル者多シ是ハ  
筆者謬ルカ

謬レルカ又胞衣胎ノ屍ニ有テ表裏ノ謬アリ是ハ  
又産論翼ヲ視ルニ囊胎ノ狀謬アリ先生異物ヲ見  
リト此一條ハ有識ト雖レ馬謬レルカ  
産論ノ說胞衣胎ノ屍上ヲ蓋テ母ノ鳩尾ノ下ニ有

者ヲ養ノ血ヲ受ルニ疑ナシ逆孕此ニ及ル三  
囊胎ノ様ト合スル時ハ考ルニ胞衣母ノ腰ニ  
ルニ胞肉ノ所ハ胎ノ尻ト頭ト蓋ヲヘキ様ナシ  
胞肉ノ近所ニアリ圖ニメ下ノ卷ニ見ス是ヲ察ス  
ヒロゲ整テ見ルニ頂ヲ以テ膜ヲ突破リ出シ穴ハ  
圖ノ如ク身ヲ潜メテ居ル又諸産アル毎ニ胞膜ヲ  
衣ヲ前腹ニ蓋テ其間ニ臍ヲ束ワタカマリ有テ  
ナリ予満月ノ囊胎産又七月ノ囊胎産ヲ見ルニ胞  
全ク包マレテ居ル其胞膜傷レヌ其儘出ルヲ去  
囊胎ハ別ニ名アラ事ヲ聞カヌ諸産ノ胎皆胞膜ニ



囊胎說

リ或ハナシ然シコレハ予ガ未タ知ラヌナリ  
氣ヲ受ルニ遠シ故ニ死血ノ痕僅ニ肩背ニアル  
置クトイヘハ熱物ノ通ル邊少ク除テ居故ニ其  
或ハ右或ハ左ヘテ肩背ヲヤハリ中脘ノ邊ニ  
ナシ又オモヘテ孕ノ者ハ頂ヲ脇助ノ下邊  
ヘシ然レハ熱物胃中ニ納リテハ外ヘ其氣受ル所  
食熱物ノ氣ヲ受ルニ數百度因テ其邊死血トナル  
倒ニ居ルハ月後ハ尻腰ヲ鳩尾ノ下ニ置ク故ニ飲  
メ消ス如トナレハ是死血ノ痕ナリ胎ニアル

或曰小兒腰脊ノ邊ニ青ク班文アリ漸々三年ニ

小兒腰青痕說

ルク當ルノ三

ハケ薄シ或ハナシ横骨中ニ入ラ又者子宮ニ緩  
拒ムナシ咬レ又故ニハケノ文薄シ又逆孕ノ兒  
故ニ胎ノ頭上腹ニ位シ頂ノ横骨ノ中ニ入ラトナリ此  
二アリテ頂横骨ノ中ニ入リ拒テ咬シテトナリ此  
凡小兒頂ノ後ニ横様ニハゲ文アリ此ハ母ノ腹  
小兒頂後有禿說

ナキモハ死ス

ナキモハ死ス  
卷之四  
胎前



診ノ二米粒經ノ動氣アル者ハ必ス活ク動氣絶テ  
ノ邊ヲ數遍撫テ勢ヲケヘシシカメ虚里ノ動ヲ  
ナキハ命危シ如此モハ急ニ頂ト胸ト腹ト或ハ脊  
凡難産初生ノ兒坐草ノ上ニ於テ身弱ト啼ク  
救初生虚兒說

ルナシ  
掌ハ兒出ルテ去ルハカヲ然スハ陰門傷ル  
ハ兒ノ頸ヲ擣テ努力ト共ニ引出スヘシ肛門ニ當ル  
ヲ已ニ兒ノ頭門外ヘ出兒ノ両肩交骨ニ拒溢ル者  
留メ片手ヲ以テ母ノ身ヲ抱ヘ肩ヲ以テ前腹ニ當

護產門術

肛門ヲ突張ルヲ待テ醫片手ノ掌ヲ以テ肛門ヲ推  
如ク細クメ危シ此ヲ傷ルハ子婆ノ謬ナリ胎ノ頂  
凡臨産已ニ胎ノ頂出ル時陰門ト肛門ノ界肉糸ノ

ルヘシ子宮ノ口邊ヲ探テ見分クヘシ  
ヲ入羞シ胎ノ類ニメ出ヘキ物ハ止事ナク努力ナ  
東ヲ瘀血ヲ包ム下リ謬テ手ヲ以テ推シ下ヘカ  
疑テ一槩ニ好或ハ異物塊ト謬ル可ク是ハ子宮  
ノ上邊ニ當テ大挽ノ程ノ狀九キ一鬼下ル下リ  
宮縮マリ本位ニ復シ消スルガ如ク愈又一種横骨



ト宜シ熱証者大黃牡丹皮湯ニテ宜シ瘀血下リ子  
方腹冷ノ者ハ折衝加附子或ハ木槌湯加附子ナ  
ノ瘀血モ十倍ニ滿メテル様ニ見ユルヲリ其治  
如ク中ニ物充滿メテル様ニ手ニ應スル者ヲ僅  
非ス腹中ノ寒熱ニ因テ子宮努テボス鼓脹ノ  
者ヲリ胎ノ有様ニ似タリ數人試ルニ瘀血三ニ  
凡産後一兩日中ニ腹ヲ探見ルニ一物大塊ナル  
産後腹狀說

忽チ半ハ愈ル程ノ功ナル者多シ  
又シテ<sup>立地</sup>愈ニ愈ユ又重者トヘハ服藥セ又前ニ

ハ予ハ必ス勸メテ身ヲ卧シムルハ輕キ者ハ藥セ  
凡産後身ヲ起シテ蹠テ居テ血暈ヲ發ル者ナレ  
モハ其苦ムル産籠ニ同シ皆忌ムヘシ  
産婦ヲ寄著シメテ蹠テ居シムル凡十一日夜スル  
惡証ヲ發ス此故ニ予力郷ニ用ル産所ニ物ヲ積テ  
マラセテ居ラシムルハ倦テ身ヲ動シ氣血ヲ動シ  
ヲ卧テ安シラスルヲ宜トス産籠ノ類ニ身ヲ蹠  
スハ氣逆ノ血暈ヲ發スル基トナシ故ニ身  
トヘ氏西三日身ヲ直ニ立ツ事ナカレ血室ヲ動  
宜シキナリ只身ヲ反リテ卧ヲ忌ムヘシ假令健婦



ク臥シテ足ノ伸ヘ屈メノハ婦ノ意ニ任セテ  
ムヘシ枕ヲ常ヨリ少シ高クシ先ニ右地ニ着  
立テ歩行スヘカテ膝ヲ頭ヲ地ニ著ケ静カニ着シ  
凡産後坐草ヲ去テ膝ニ身ヲ著シムルニ必ス身ヲ  
産後保養

モノナシ是レ自然ナリ  
ノ者寐テ血氣ヲ安スルニハ身卧セシムルニ勝  
ヒ忽チ健カニ本ニ復スル者多シ按スルニ凡テ苦行  
百人試ルニ害ナク宜ク産婦モ亦各々大ニヨロコ  
婦ヲ見ル毎ニ勸メテ産後必ス身ヲ卧セシメテ數

ト謂フヲ知ラズ予ハ子玄子先生ノ説ヲ信シ産  
古昔ヨリ世ノ人漸々習トナリシ事ナレハ害アル  
ハ害ヲ求テ功ナシ其害ノハ条ハ産論ニ委シ然氏  
箱ノ如キ物ノ中ニ身ヲ踈クマシ居ラシムル  
凡東都ニ産籠京都ニ産椅ト稱メ三方四方間キテ

産椅説

求ルモノナリ産後モ同シ  
スハシ但緊シキヲ忌ムヘシ胎ヲ推シ倒シ難産ヲ  
テ能カラシム然ラハ敢テ捨ヘカラス輕ク程ヨク  
又其好ム所ノ有様ヲ考ルニ産前後氏ニ氣ヲ輔ク



及ハカヲサレサレ氏然シ予數百人ノ孕婦ノ意ヲ問ヒ  
凡鎮帶ヲ用ユルハ萬物自然ニカス時ハ此ニ

鎮帶說

ヲナスモノナリ慎ムヘシ  
者ハ腹中ニ死スルカ又ハ推倒シ横産杯ノ大難産  
シ胎ニ悶ヲ成サシム尤モ忌ヘキナリ又程ヲ過ル  
シ或ハ交接ノ時腹ヲ重ク逆ニ推シ腸胃ト共ニ動  
ヲ成テ或ハ斜ニ或ハ推倒シ又重物ヲ持テ往來  
且寐ルニ身ヲ改テ兩足ヲ屈シ胎ニ碍リ動カシ悶  
凡難産ヲナス者ハ第一鎮帶ヲ緊ク束テ胎ニ碍リ

難產說

二限ルヘシ  
ノ狀實ノ明カニ分ツヘシ經リテ凡七十五日後ハ胎  
此ニ倣テ見分ツヘシ如クナリ半產ノ目的ナリ其餘ハ  
肌肉潰レテ斯ノ如クナリ半產ノ物ト白精ノ物交ヘテ有ルハ  
カナル血ト薄黃色ノ物ト見分ツヘシ紫黒血ノ中ニ鮮  
然ル者ハ其下リ物ヲ見分ツヘシ安クシテ見失フナリ  
拭サル時綿衣ニ當テ潰レ安クシテ見失フナリ  
肉精淨ニヌカニ空キガ如シ此故ニ血ノ穢ヲ  
体ヲ設テ小籠巢中ノ子ニ似タリ十指狀ヲ肌



五  
ハ最  
早  
者  
ハ  
遇  
ル  
者  
ハ  
五  
三  
日  
ヲ  
終  
テ  
凡  
三  
五  
日  
ヲ  
過  
ル  
者  
ハ  
最  
早  
五  
下  
ル  
者  
ハ  
半  
產  
ノ  
目  
的  
ナ  
リ  
然  
レ  
其  
下  
リ  
物  
ヲ  
見  
分  
シ  
ハ  
シ  
或  
ハ  
痛  
ナ  
ク  
血  
下  
ル  
者  
ヲ  
先  
ニ  
水  
下  
リ  
次  
ニ  
血  
漏  
ト  
見  
分  
ケ  
テ  
ハ  
シ  
何  
レ  
ノ  
証  
ニ  
モ  
腰  
痛  
腹  
痛  
下  
崩  
凡  
月  
水  
二  
三  
月  
止  
テ  
卒  
ニ  
血  
下  
ル  
者  
ヲ  
流  
産  
ト  
崩  
別

レ養  
ヲ  
受  
ケ  
又  
者  
ハ  
胎  
死  
ノ  
脉  
動  
絶  
ハ  
シ  
離  
テ  
胎  
ノ  
養  
ヲ  
脉  
動  
ナ  
ル  
ハ  
故  
ニ  
胞  
母  
ノ  
腰  
ヲ  
離  
中  
ニ  
脉  
動  
ナ  
シ  
此  
母  
ノ  
血  
胞  
衣  
ニ  
ク  
シ  
莖  
中  
往  
來  
シ  
摘  
シ  
テ  
試  
ム  
ヘ  
シ  
活  
胎  
ハ  
莖  
中  
ニ  
脉  
動  
ヲ  
死  
胎  
ハ  
莖

ル者アリ死胎活胎ヲ悟ラシト欲セハ其帶ヲ指ニ  
拒ム故ニ臍帶本位ニ復ラヌヲル故ニ先タチ出  
リテ頂ニ戴キリシテ後ニ頂横骨ノ中へ入り下リ  
母若シ顛卧ナト身ヲ轉動シ臍帶其本位ヲ解下  
者アリ又一種ハ胞胎本位ニアリテ無事ト入  
キ水漿ト共ニ下リ出ル者アリ又胞ヲ共ニ出  
又其間ヨリ子宮ノ邊へ落着テアル故ニ頂ニ戴  
ク下ニ落下リ臍帶モ伸下リ頂未タ横骨中ニ入  
カ毒ニ當ラ離テ養ヲ受ケ又故ニ胎死入胞モ亦虚  
ハ前ヨリ死胎ニナリ胞ノ母ノ腰ノ裏ニ着所何レ



シ胎ノ頂ニ先々チ出ル者アリ此ニ種アリ一種  
發シ胞膜胎ノ頂ノ邊サケテ水幾走リ下リ臍帶若  
モ是ヲ後<sup>サ</sup>産トモ又<sup>サ</sup>跡<sup>サ</sup>産<sup>サ</sup>ト然ルニ臨<sup>サ</sup>産<sup>サ</sup>努力ヲ  
胞衣トノ間ニアリ産ノ時後ニ出ル者ナリ世俗ニ  
凡臍帶ハ胞衣ノ裏ニ着テ胎ノ前腹ニ束子蟠リテ

臍帶說

後人ノ名論ヲ俟ツノ三  
度ノ精氣ノ餘リ謂フハキヤ鮮シ難キ事ナリ只  
力ヲ入然レハ品胎品胎ヲ生スル者ハ此モ交接一  
ノ小弱ナル者アリ必<sup>サ</sup>交接一度ニマ<sup>サ</sup>孖<sup>サ</sup>生ト云

著ノ様ヲリ又子一胎大ニツノモノニ自然ニ肉愈  
テアリ案スルニ元來ニツノモノニ自然ニ肉愈  
蓋シスモアラシカ胞一ツトイヘ子膜ハ必各構  
胎品ニ限ル子ハ信セス凡一胞ニ子ヲ孕者ハ  
生ト子按スルニ此説ハ交接一度ニ子變胎品  
巢氏病源論ニ曰陽施シ陰化シ精氣餘アリ故ニ  
二暗シト謂ヘキナリ  
取リテ謬ルニ當ルヤハリ推察ニメ化理ト本位ト  
ニ玉ヲ二ツニ度ニ納レテ又此ヲ出入次第ノ理ヲ  
出ルヲ比ト名ク子其意ヲ按スルニ假令ハ穴ノ中



又明ノ李空同ノ說ニ好先ニ出ルヲ第ト名ケ後ニ  
シ化理ノ次第ヲ考テ前文ニ倣テ名クヘシ  
同アルアリ此故ニ出ル時ノ前後ヲ窮テ名ツク難  
ト又雙順雙逆ヲ一逆一順ノ者出ルニ次第不  
シ故ニ後ニ出ルナリ然レ胎ノ躰大小強弱ナル  
ハリ産門ニ近シ前腹ハ容孕ノ假坐ニソ産門ニ遠  
アリ按ルニ脊ノ邊ハ先胎ノ居ルヘキ本位ニソヤ  
ニ著居テ後ニ孕ノ胎ハ前腹ニ有リテ重リ居ル様  
見ルニ凡先ニ孕メタル胎腹ニ有リテハ母ノ背ノ邊  
世ノ說先ニ出ルヲ第ト名アルアリ子好孕ノ數産ヲ

凡古人ノ説ヲ先ニ出ルヲ兄ト名ルアリ又其後ノ  
ト名クテ可ナラシ  
ルハ軀大ニソ健カニ強者ヲ出產ノ前後ヲ不厭兄  
均者モヤハリ先ニ出ルヲ兄ト名ク又大小強弱ヲ  
ルヲ兄ト名ク又兩胎共ニ疲弱並テ大小強弱ヲ出  
前後ヲ厭ハス兩胎均ク健ニ強者ナル時ハ先ニ出  
予カ定ル所ハ先胎孕ノ化理ノ次第ヲ悟テ公婉ノ  
凡孿胎兄弟ヲ名ル事古人ノ説同シカラス其説ヲ  
入  
著ク所其狀三種アリテ定リサシ圖ノ下ノ卷ニ記



凡胞衣兩胎一胞ノ者ハ形必大ニメ臍帶兩條胞ニ  
又母無事ナルモアリ産シ終テ死シタルモアリ  
テ次ニ正兒生ルハ見ル其兒小弱ニメ日中ニ死  
ツハ異物孕ノ者凡三度コレ見ル皆先ニ異物出  
大ニメ次ニ生ルハ兒多ハ小ナリ又ハ正兒一  
凡乎力知ル所ノ好數ノ中先ニ生ルハ兒多ハ狀  
トヲ亂シ見ル化理ノ本ヲ知ル要ナリ  
ト大小強弱ト兩胎一胞ノ者臍帶ノ根本胞ニ著所  
ハ健ニ大ニメ子ハ弱ナルアリ其初生ノ前後  
又胎ノ身ノ大サ好共ニ大小ナク同キアリ又子

凡變胎雙男子アリ又雙女子アリ又一男一女アリ

ハ

アリトイヘ氏各膜ヲ構テアリ圖ニ下ノ卷ニ見  
凡變胎各ニノ胞ニツアリ又共ニ一胞ノ者

難キアリ考ヘシ

ヲ探ルニ手ニ應スル各異ナリ又異物孕ノ解シ

又双順胎アリ又雙逆胎アリ又一順一逆孕アリ是

孕ニモ腹大ナル者アリトイヘ氏其格別異ナリ

シ一胎ハ母ノ脊ノ邊ニ著一胎ハ前腹ニ居ル且平

ハ漸々前へ突出シ九月臨月ニ及テ其形子甕ノ如



凡變胎ノ腹狀六ヶ月以前ハ見分ケカタクシ七ヶ月後

變胎說

下ニ載タリ

治セ又ト謂「ナシ第六ノ手術ハ下ノ卷按腹ノ條  
ニ謂ル胎轉動治術ト此整胎ノ術トヲ施セバ全ク  
今如何様ナル轉動歪斜變急ノ痛ヲルトイハル  
ヒラハ其様ニ隨ヒテ術ヲ前ニ倣ラスヘシ假  
子啓ノ良術ナリ若胎ノ難カタム「左ノタカ  
リニ翼ノ第六ノ手術ヲ施シ整和メ置クヘシ此ハ  
子先生ノ發明セラル萬代不朽ノ名術ナリ而シテ終

位ニ復ラ又中ハ何遍モ此術ヲ施ス此術子玄  
督脉ト重子相合スル様ニスハ是ヲ本位ト本  
ノ頭ヲテ緊ク推胎ノ脉ニ直ニ任脉ト胎ノ  
其マ留メ左腹ノ尻腰ヲルヘキ所ヘ右手ノ大指  
指頭ヲテ任脉ノ下ヘ推倚セ左手ノ指頭ヲ以テ  
左腹ニアリ醫先ツ右小腹ヘ倚ル処ノ頭ヘ両手ノ  
凡術ノ傳若胎ノ頭右小腹ヘ寄りハ尻ハ必ス上  
至リテ其術同シ  
リ活胎モ死胎モ整胎ノ術ハ胎ノ脉ヲ直ニ作スニ  
ク手ニ應スルヲ死胎トハ氏胎直ニ居ルヲ



如輪ノ子十ク順ハ者キ甚リナルニ様横  
逆分チ死胎杯ハ或リ居二斜ハ或ニ位本  
大ニ此探ノ兒ハ月後七令術胎ノ整凡  
シ入胎整シ施術知其否ヤル  
謂ル前二欲セサ施術胎ノ整凡  
胎轉動入

整胎術

二翼ノ第六術ヲ盡スヘシ  
終術ノ諸凡カラスヘ輕サ奇術ナリ所ノ知  
發明予ハスヤ愈テ全テ推テ見ヘ又知  
所又見ムルニ試シ蓋シナト云ト愈ヘ

胎ヲ探リ其狀ヲ見ルニ試ミ推テ痛ヲ覺ヘサル者極  
又胎本位ニ轉シ此ヲ施ス日施メ愈ストイフナシ  
度施メ愈ル重者ハ二三日施メ愈ストイフナシ  
ニ止ムハシ此皆本位ニ復ルナリ輕者ハ一日二三  
推入テ數回入ルハ漸ニ合シ全ク愈ニ隨ヒ痛更  
入ク緊ク推テヤハリ徐力ニ手ヲ引緩ルメ又緊ク  
キテ人ト痛ヘシ若シコラヘカ又ル痛様アラハ  
的ニ定メヤハリ其所ヲ指頭ヲキヒシ推トキハ  
ハ胎轉動メ本位ニ背キシ所ナリ治術ハ痛所ヲ目  
邊稍力ヲ強ク推シ痛アルヤ否ヲ問ヘシ痛アル所

胎ヲ探リ其狀ヲ見ルニ試ミ推テ痛ヲ覺ヘサル者極  
又胎本位ニ轉シ此ヲ施ス日施メ愈ストイフナシ  
度施メ愈ル重者ハ二三日施メ愈ストイフナシ  
ニ止ムハシ此皆本位ニ復ルナリ輕者ハ一日二三  
推入テ數回入ルハ漸ニ合シ全ク愈ニ隨ヒ痛更  
入ク緊ク推テヤハリ徐力ニ手ヲ引緩ルメ又緊ク  
キテ人ト痛ヘシ若シコラヘカ又ル痛様アラハ  
的ニ定メヤハリ其所ヲ指頭ヲキヒシ推トキハ  
ハ胎轉動メ本位ニ背キシ所ナリ治術ハ痛所ヲ目  
邊稍力ヲ強ク推シ痛アルヤ否ヲ問ヘシ痛アル所



以テ左右ノ章門或ハ上脇腹ノ邊又横骨ノ左右ノ  
人ヲ仰卧セシメテ醫者左邊ニ坐シ兩ノ手指頭ヲ  
アリ腹ヲ按テ痛ム所ヲ不和ノ所ト知ルヘシ先婦  
或ハ腰伸ザルカ或ハ寐テ右カ左カ一方寐キ者  
覺ハサル者モアリ然ル者ハ何レ腹部和シ難キカ  
吐逆ノ滯食ノ如モアリ或ハ胎ノ三轉ノ敢テ痛ヲ  
ク着所不和ニナル故ニ腹部急痛又甚キ者ハ或ハ食  
ノ悶ハ本位ヲ背ハ前文ニ謂ル胞膜子宮ノ裏ニ全  
凡姪娠ノ者月々中ニ物ノ爲ニ碍ハラレ胎轉動  
驗胎轉動并治術

効ナシ

ヒリ痛ミアルハ効アリ痛ナキハ藥氣ナキユ正ニ  
シ上水ヲ綿ニシメシ痒所へ着テ宜シ微シクヒリ  
戸甚ク痒者ハ藥氣ノアル生ク乳ノ燒滓ヲ水ニ浸  
ヒ薰メ宜シ濕熱アル者ハ加黃柏煎ノ宜シ若シ陰  
ノ煎汁ニ綿ヲ綿シ浸シ上ケテ絞リ陰門腫タル所ヲ蓋  
ル時拒サハハリ急ニ腫レ痛ムアリ産後蒼朮薄荷  
氣アル虚弱ノ肉ヲ子婆手荒ク擦リ或ハ兒ノ頭出  
ニ堪ヘカクシ龍翔飲ニ宜シ一種ハ陰門兩邊濕  
赤ク腫ル証アリ此証針忌ム針スレハ血出テ痛



ヲ漏入一雨ノ如シ即二消ス一 種ハ陰門西邊  
ノ失一分計ヨ陰戸兩邊ノ所ヲ治ヲ急ク者ハ三稜針  
リ腎氣圓若クハ臨ニ近ク皮肉ノ色白精ニ光ヲ  
邊大腫レフクハ如ク肉ノ色白精ニ光ヲ  
凡產前後陰門腫ル者三種下リ一 種ハ水腫陰門兩  
陰門腫說

効アリ  
心下痞氣急大小便澀者甚ハ平水丸兼用ヒテ大ニ  
用ヒテ効アリ熱症者ハ加芒硝辟角ニ宜シ又  
或ハ數々咳嗽大小便秘澀入此証大抵大抵柳湯ヲ

榔湯ニ宜シ惡証ノ者ハ心下痞シ嘔吐或ハ渴甚ク  
ニ宜シ又胸滿痞氣急衝心セシト欲スル者ハ大抵  
者如附子若シ心下和シ難キ者如木瓜枳榔吳茱萸  
力セニ爲入力ヲ越婢加蒼朮茯苓ニ宜シ身冷ル  
膝弛緩スル者ハ脚氣腫ナリ產前後ニアル<sub>ニ</sub>忽<sub>ニ</sub>  
咳大小便秘澀シ或ハ氣急或ハ手足麻痺シ或ハ脚  
湯ニ宜シ一者轉胞水腫ノ症ニ似テ呼吸短促喘  
入胎ノ否モ分々入水腫ノ証アリ腎氣或ハ禹水  
部両脚腫滿ニ腹ヲ堅ク鼓脹ノ如ク指入  
予治方ナシ一者此証ニ似テ面部胸部背兩肘瘦腹



分リ難ク若真ノ鼓脹ハ滿ハ治シ難ク産後必ス死ス  
瘦テ腹脹滿ノ腹ヲ按ニ内脹滿甚シク姪娠ノ否王  
宜シ腹熱アル者ハ猪苓湯ニ宜シ一者面部四肢  
モ見分ク難シ又整胎ノ術モ功ナシ治方腎氣圓二  
テ死胎トナルハシ腹ヲ探ルニ内充滿ノ胎ノ順逆  
アリ早ク小便ヲ利シ治セサルハ水氣胞膜中ハ入  
入ノ子宮ノ中ハ水氣已ニ流レ入ラシト欲スル者  
腫ナク或瘦セ獨リ腹滿ノ裏水ノ症ヲ鼓脹ニ非  
後必ス死ス子治方ナシ一者面部四肢常ノ如ク  
肩脊兩時大ニ腫胸以下腫ナキ者多ク治シ難シ産

便ヲ利入ヘシ腎氣圓ニ宜シ腫ル者ヲ治方同シ小  
者又同症ニ陰門西邊大ニ腫ル者ヲ治方同シ小  
凡妊娠腫滿六種アリ一者轉胞水腫小便不利  
妊娠腫滿

二隨フキナリ

ル者ハ逍遙散如山梔子半夏阿膠ニ宜シ其餘ハ証  
安胎湯膠艾四物湯如半夏ニ宜シ若シ風邪熱フ  
入ル者ハ按腹整胎ノ術ヲ盡ス肝要ナリ治方  
トノハ妊胞膜傷レ又者ハ治シ愈ス胎斜ニ轉  
者ハ治術ヲナク半産ス此故ニ水血下ル



シ一種ハ胞膜中ニ僅アル真漿水膜破レテ出ル  
ヲ漏ス二種アリ一種ハ膀胱ノ餘水ナリ治シ易  
ス或ハ血漏レルヲ血ハ胞膜ノ外ニアリ又水  
ノムキ不和ニナリ其間ヨリ膀胱ノ餘水ヲ漏シ出  
ササシム故ニ胞膜子宮ニ全ク著ク所表裏本位ニ  
入ルハカラス然ルヲ物ノ爲ニ障リ有テ動シ悶ヲ  
ノ如シ其中ニ全ク實ノ居レハ邪モ水氣モ容易ニ  
膜一囊ノ如ク全ク包ミ子宮ノ裏ニ固著ノ裏ト表  
胎悶ハ水漿下リ或ハ血下ル者ハ前ニ謂ル胎ハ胞  
凡孕婦一ツ疾下ルカ又ハ顛臥シテ腹ヲ動カシ

水血漏下

へ氏ハ腰痛甚キハ何ヤ是ヲ以テ明ムシ  
凡死胎産ニ胞衣先ニ出ツルヲリ胎後獨リ出トイ  
痲ヲ放シタル様アリ見分クヘシ  
胎ノ胞衣ハ時ナク俄ニ離ル故ニ不熟ノ痘シ痘イテ  
如シ然ハ臨ハ産ノ時俄ニ離ルニモ非タ又半産墮  
離レシ様アリ譬ハ痘瘡熟シ結ノ放タル形ノ  
痛ニテラヌ又胞衣ノ形ヲ見ルニ盖シ臨産ノ前ニ  
ニサハハル故ナルヘシ獨リ胞衣ノ離ル一條ノ  
ヲ得テ陳疾腰痛スル様ナリ此兒ノ體陷リ腰ノ裏



月二至ハ胞衣最早漸ニ離レ胎毛隨テ下リ時  
著ク處離レトシテ痛ト余カ按ト異リ蓋シ滿  
產科費家曰臨産ノ時腰痛甚キハ此胞衣腰ノ裏ニ

臨産腰痛說

落ルニ及シテ身ヲ反シテ仰クハシ  
シ此故ニ兒皆伏テ出ル然シ女子ハ産門ヲ出地ニ  
倒ニ居ル故ニ産科ニ名アル人トハ氏見分カ  
凡胎腹ニアリテ男ヲ共ニ面ヲ母ノ脊ノ裏ニ向テ  
男女說

脉動アリテ死胎ハ絶テ脉動ナシ

ツシ胎ノ臍へ往來スル脉動ナリ此故ニ活胎ハ  
中ニ脉動ナキ者ハ死胎ニ決ス是ハ母ノ血胞衣ニ  
胎ノ二種アリ其出ル臍帶ヲ指ニツバソテ試ニ帶  
凡臨胎ノ頂ニ先ツテ臍帶ノ出ルニ死胎ト活  
ヲ安入ヘシ

ト見定メ進ニ難キ者ハ回生ノ術ヲ施シ母ノ苦痛  
スル者ハ產安キヲリ一ノ藥ニスヘカヲ尤死胎  
トヘ氏頂直ニ產門ニ向ヒ母ニ勢ヒ有テ努力發  
リ止リ死胎故ニ下ニ進ムヲナキ故ナリ然シ死胎  
推ナキハ死胎ナリ是ハ胎ノ體橫骨ト交骨ニ當



凡胎二臨ヲ努力ヲ發入レ氏俄ニ止胎門入王敢ヲ  
ルハシ又臭氣ニ厚薄アリ時ニ臨ヲ考ヘシ  
多ク下ル者初ハ臭氣ナク又臭ノ時漿水臭ルハシ然氏水  
モ色常ナラ入又産ノ時漿水臭ルハシ然氏水  
ハ濁膿汁出シ又唇上灰白ニ色ヲ變ス亦舌上  
ノ身腐爛スレハ腹中鳴ヘシ然ル者ハ乳汁絞リ出  
凡死胎ノ者ハ腰重ク腹ニシヅナシ着久クメ胎  
著ニモ非ラ考ヘシ  
下々腹ハ落チ又モ下リ死胎必下々腹ハ落ルト去  
體ニ著所離レ又中ハ子ノ身モ其位ニアリテ未タ

カヲ入又水腫腹滿ノ者若死胎トイヘ氏胞衣母ノ  
動クアルヘシ姪婦多シハ淺俗ナリ其辭証ト入  
故ニ胎ノ四肢伸ビ或ハ屈シ或ハ母ノ呼吸ニ隨テ  
非入母ノ身ノ起ハ或ハ横ニ様ニ寐テ身ヲ轉ル  
入何レモ其母ニ問ヒ動クト答ル氏ヤハリ活動ニ  
テ張り動ク如シ其動ヲ見テ活胎ト思フヘカ  
推探ルニ肘力膝ニ踵ニ當テ其手ヲ放テハ起  
リ胎斜ニ居ルヲ或ハ下腹ヘ落テ居ルヲ此ヲ  
數遍撫探リ後ニ忽チ瘦テ胎ト腸胃ト界アルニ似タ  
石ノ如ク潤ヒナク母ノ腹肉モ先ニ張テ見ヘテモ



凡死胎日數ヲ經テ探ル胎ニ應入ル木  
シ内經曰故無損亦無損ト是ナリ  
シ其証アル者ハ假令大黃芒硝トハ恐ルナ  
シ効アリ若シ他証アル者ハ証ニ隨ヒ方施入  
功ヲ得タリ又外臺秘要方ニ微テ鯉魚ヲ製メ兼用  
加減多少ハ證ニ證ニ臨テ量ルハ大槩右方ヲ用ヒテ  
子半夏正氣天香湯如當歸沈香右三方附子  
平和劑沈香天麻湯如何膠紫蘚和氣飲如何膠附  
嘔吐アル者虎翼飲伏龍肝汁ヲ以テ煎服メ効アリ  
胎者補劑如阿膠半夏經驗予力用劇々方也姪姪

者瀉心湯兼用如潮熱者宜大柴胡湯臟氣弱及死

證輕者道送散或加山梔子腹熱不止時大便秘

夏四君子湯加阿膠者氣六君子湯加阿膠熱

膠半夏真武湯加阿膠半夏小建中湯加阿膠半

湯加阿膠八物湯加阿膠半夏桂枝芍藥湯加阿

安胎湯膠艾四物湯腎氣丸加阿膠第一和劑

臟氣弱虛冷入者八治方左如

ハシノ宿病アル者ハ宜ク其証ニ隨フハシ如シ

ル前ヨリ出産ニ趣ク逆藥ヲ休ムナクテ養ス

ハ治シ易ク入各問テ其セヨ知テ死胎ニ成サ



死胎二趣少者其次ナリ孕毎四月以前胎隨スル者  
臨月二死胎二趣少者ハ活胎ノ治療シ六七月頃  
事ヲ知ラサレハ功ヲ成難シト知ルヘシ又八九月  
ハ鬱氣ヲ開ク劑ヲ與ヘ氣ヲ快クシ又前方ヘ復ル  
劑ハ時ニ泥ム「下」知リ此ヲ間ニ平和ノ劑或  
及ヲ知リ治ヲ施スヘシ假令應ル藥トイヘ補  
驗方ヨ左ニ記入然レハ前方ノ前後ノヤトリ過不  
療スル二十人ノ内ハ九人ハ功ヲ得タリ因テ其經  
八月或ハ臨月死胎ヲ産スルヲ嘗テ數十人ヲ  
ナリ証ニ隨ヒ施治スヘシ又孕毎二三四月或ハ七

二不長十リ或ハ其人ニヨリ臍氣弱虚冷者胎不長  
凡孕毎ニ胎不長者宿病ニヨル者調養ヲ失力故  
リ此胞膜サケ又故ナリ

經終ヲ三百日過キ十一ケ月ニ死胎ヲ産タルヲ  
レハ膜サケテ忽チ産ニ趣クアリ予力知ル所ノ者  
ヲ持力或走テ身ヲ動カス「劇シキ力或ハ顛仆ス  
十日百日ニ及ハ氏産ナシ胞胎爛レシ者母重キ物  
又死胎久シク腹ニアテモ胞膜サケ又中ハ七八  
ケシテ産ナシ或ハ忽チサケテ即時ニ産ニ向テリ  
凡胎腹中ニ死スト云ヘ氏胞膜サケ又中ハ常ノ如



死胎說并治方

クハシ  
レ攪テ以テ子宮ノ口邊ヲ突張ルヲリ審ニ見  
フ横骨ノ上ニ見ハシ或ハ手ヲ伸シ横骨ノ中ハ垂  
ニ僅ニ一二アルノ三又順孕ノ者モ七八頃ハ頂  
放ハ又頂ヲ脇ハテラノ居ル此逆孕ノ狀ナリ百中  
様アリ因テ按腹シ整胎ノ術ヲ盡スト雖モ其手ヲ  
テ居ル此故ニ時ニ子宮ノ口邊ヲ踵ヲ以テ突張ル  
シ尻ヲ小腹ノ下ニ置テ足ヲ屈シ踵ヲ横骨ノ中ハ垂  
右或左脇腹ハ斜ニテラシ肩背ヲ中脘ノ邊ニ見ハ

分ハシハ九月臨月ニ及ハ頂ヲ母ノ胸ノ下或  
居ル六月以前ハ胎ノ順逆見分チカクシ七  
月後見  
凡逆孕ノ狀ハ頂ヲ上ニシ尻ヲ下ニシ手足  
ヲ屈メ

逆孕說

ル力如ク身ヲ潛テ居ルナリ圖ニ下ノ卷ニ  
シ居ル其狀物ニ譬ハ地ニ伏テ居ル蛙ヲ倒  
ニ見  
順孕ノ本位トス面ヲ母ノ脊ノ裏ニ向テ足  
ヲ屈  
上ニ腕ノ邊ニ見ハ下ハ頂横骨ノ中ニ入ル  
此眞ノ  
止テ走リ上下四方ハ肥長ス臨月ニ及ハ胎  
ノ尻  
月横骨ヲ離レ臍下ニ近クシ七月中旬臍  
下ニ上リ



リ四月ハ横骨ノ上半見ハル五月ハ小腹ニ至ル六  
漸上へ上ルへシ然シ二三月ノ中ハ横骨ノ中ニ下  
宮ノ口邊ニ下リ胎ノ狀ヲ得ヲ日ノ月ノ育長シ漸  
凡姪娠初月ヲ胚渾ト去大サ小鳥ノ卵ノ如クメ子

姪娠次第説

ギ黒鯛ノ鱗ヲカスナメリ貝ハイタラ貝等ナリ  
莖葉并實ニ生テ根オロシノ醋製ハハ鮭ノ鱗ノ子  
ムナシ害ヲ予其害下ル物ヲ驗ルニ先白芥ノ子并ニ葛  
者ノ治方ニ鯉魚ノ大ナルヲ用タル數方アリ忌  
害ナシ已ニ外臺秘要ヲ親ルニ姪娠數々胎ヲ傷ル

凡孕者古來ヨリ俗ニ川魚ヲ忌ム予數十人試ルニ  
ク伸シテ宜シ

此故ニ腹帶ハ輕ク程クシ寐ルニ兩足ヲ常ノ如  
モ斜ニシ或ハ橫樣ニスレハ難產ヲ求ル惡事ナリ  
下足ヲ屈シ寐ハ胎ヲ推タタクシ悶ヲサナシ胎  
ヨリ吉ト言傳ヘシハ大ナル謬ナリ上腹ヲ束留  
凡孕者寐ニ足ヲ屈シ腹帶ヲキヒシク束ルヲ古來  
穢レハ熱湯ニ綿ヲ浸シ絞リ拭サリ清クスヘシ  
ハ寒熱自汗盜汗氣汗危キ証ヲ發スヘシ偕身  
若シ不快ノ者ハ限ナシ然ラザレハ身體腫ルカ又



レハナリ産後ハ假令健婦ト云氏二十日忌ム入シ  
尚九月ヨリ更ニ忌ム入シ産後病ヲ發スルヲ恐ル  
シ盖沐浴スレハ腠理開テ風ヲ襲ヤケレハナリ  
感スル少シ特沐浴スルヨリ外邪ヲ得ル多  
凡姪娠ノ者沐浴ヲ忌ム入シ孕者内實スレハ邪ニ

姪娠忌法

ハ是自然ナルハシ  
事ヲ上乳汁トナル故ニ凡二三年經水止テ不通ナ  
ラ養ヲ受ク故ニ胞中ニ下リテ上ラ乳汁ナシ産後ハ  
經水トナルヲ按スルニ胎腹ニ有テ經水ヲ以テ專

乳汁説

キ乎

凡婦人ノ心經ト胞ト中ト表裏タリ上乳汁トナリ下

是又人ニ咽ト嚙ト有テ氣道穀道各異ナル者ノ如  
輸シ一ハ以テ血ヲ注キ一ハ以テ氣血ヲ及ヌ者也  
片倉元周曰凡莖中三孔有テ相通一ハ以テ氣ヲ  
血ト相和スルヲ環ノ端ナキカ如シ  
ヲ周流シ而復臍ノ動脈ヨ胞ニ衣ニ飯シ其母ノ  
一身ヲ周流入ル者大人ト異ナルヲナシ其血一  
漸ク是ヲ肝ニオクリ肝ヨ心ニ傳ヘ心ヨリシテ



血ヲ胞衣ニ受ク其血浸漬ノ其臍ノ血帶ノ血脈ニ傳ヘ  
凡胎ノ子宮ニ下ルヤ其養ヲ臍ヨリ受ク先其母ノ  
胎受養說

圖ニ下ノ卷ニ下リ

ニ非入狀玉ノ如クメ潤ヒ下ル者ハ姪ナリ候法  
岩ニ當ルカ如クメ手ニ應スル者ハ血塊ニメ胎孕  
ヒナク狀或尖リ或ハ長ク或ハ角張リ龜ニメ革カ  
凡腹ヲ推テ見ルニ一物二指ニ礙ツク物下レ其潤  
宿ル所ナレハ此ニサハハリ孕ムナシ  
又中ハ孕事ナシ子宮ノ邊ハヤハリ胎ノ初メ

ル「下」然ルニ此所ニ若血塊「下」者解「下」  
口邊ニ固著シ「下」者稀ナリ此証ハ半產ノ者ニ  
上小腹ノ邊ニ「下」ル者多シ横骨ノ中ヨリ子宮ノ  
凡婦人常ニ惡血ノ固著シ「下」滯ル者大概横骨ヨリ  
否シ考ヘシ

ヘシ空虛ノ時ハ疑ナシ又瘀血塊横骨中ニ有ルヤ  
考ヘシ是ナリ然シ大小便ニ催シ「下」ルヤ否シ考  
門ノ邊ヘ應「下」ルハ究テ姪ナリ又指ニコリ附シ  
ノ邊ヘ内ヨリ突張ルヤ否ト問ヘシ子宮ノ口邊肛  
和ヲケ三月前ハ横骨ノ中ヘ指頭ヲ以テ推シ肛門



左邊二座ノ手ヲ腹ヲ撫和シ兩足ヲ屈シ腹ヲ  
凡婦人ヲ先帶ヲ解テ常ノ枕ニ仰臥セシメ醫者  
酒ニ酔ノ者ニ然ルアリ一緊ニ論ス力ヲ入  
頭ニ脉動ヲ發スルアリ按ニ客陽受ル故乎又  
二非又婦人ノ中ニ夏六七月大暑ノ節不妊者モ指  
凡妊婦ノ脉三月後指頭ニ發レ妊婦ニ定リ事  
妊婦ノ然否ハ腹ヲ按メ見ルヨリ要ナルハナシ  
事茫洋一シテ風ヲ捕ヘ影ヲ係クカク知難シ  
ヲ診スルニ脉狀ヲ以テ名ツクル多シ然レ妊婦  
者ハ法ヲ以テ腹ヲ按テ見ルヘシ古人妊婦ノ然否

ハシ常ニ多シト去者ハ妊ナリ又常ニ少シト去  
ニスハシ假令四五月水見サル者常ノ多少ヲ問  
ルアリテヤハリ同様アリ是月水ヲ閉ル故ナリ審  
漏スハシ然レモ血塊腹脹ノ者ニ妊娘ノ狀ニ似タ  
根ノ圓リ紫黒ノ色ヲ發ス又指ヲ以テ摘ハ淡乳汁  
見シ又面部胸ノ經脉益青ク太ク又乳房ノ肥乳  
凡孕者三個月後ハ漸ニ諸脉ニ力アリテ指頭ノ脉  
脉力アルニ  
故ナリ故ニ餘ノ病ナキ者ハ害ナク脉狀モ宜ク只  
ノ通り安キ物ヲ好ハ子宮胃ノ口ニ至ル迄經塞ル



又故ナリヤハ常ノ食物ヲ反吐シ酸物菓實ナ  
凡孕者三十日ヲ過テ惡阻ヲ病ハ後ノ月水ニナラ

姙娠候法說

ハシ  
度ニ産スル者ハ二百七十五日ヲ過レハ追ニ産ス  
ノ期大畧日數ハ數ハ初テ孕者ハ凡三百日ヲ經テ産ス  
アリ此ヲ過レハ後ノ月水動イテ孕カタク其免時  
凡婦人ノ胎ヲ受ル事ハ月水終リテ後十日ノ間ニ  
姙娠日數說  
又シ又血塊ノ類ハ大槩左邊ニアリ

ル所ナレハ空虛ノ時アリ故ニ胎微ク右邊ハ邊入ヨリ  
凡婦人ノ左腹ヲ血室トナシ右腹ハ委食ノ腑位ス  
右子宮直腸膀胱三ツノ狀ハ圖ノ下ノ卷ニ見ス  
邊ニ通續スル小囊ナリ  
下ニアリテ上ニ口ナク下細キ管ノ如ク陰門ノ上  
腹右邊ニアリ小便ハ膀胱ニ出ツ膀胱ハ左小腹ノ  
膈膜ノ中胃大腸ヲ通リ肛門ニ出ツ大腸ハ小  
薄膜ヲ引伸シ胎ヲ絡ビ全ク囊ノ狀ノ如シ大便ハ  
テ裏ト表ノ如シ又胞膜ハ胞衣ノ厚肉ノ四邊ヨリ  
ニ身ヲ潜テ倒ニ居ル其胞膜ハ子宮ノ裏ニ固著シ



中ノ胎リ囊ヲヘル膜ト又胞膜トハ胎ハ時ハ胎ハ蓄ハ胎ハ陰戸ニ續テロアリ常ニハ縮リ細ク中  
二水ヲ蓄ヘ胎ハ時ハ胎ハ蓄ハ胎ハ陰戸ニ續テロアリ常ニハ縮リ細ク中  
口ナク下ハ陰戸ニ續テロアリ常ニハ縮リ細ク中  
ノ間ニ子宮トイフ胎ヲ孕ム囊ヲテヤテハ胎ハ時ハ胎ハ蓄ハ胎ハ陰戸ニ續テロアリ常ニハ縮リ細ク中  
凡婦人ノ腹妊ノ位スル所ハ膀胱ノ後廣腸ノ前

妊娠胎位說

門人南總森哥女保佐

同校

男 周達

上總周准郡大牧周西署

產科指南卷上

目錄畢

圓生鈞胞術

兒啼母腹中說

經驗方二十六首

母死活兒術

半產說

忌房事說

囊胎說

背面倒首論

小兒頂後有禿說

小兒腰青痕說

護產門術

救初生虛兒說

產後保養

產後腹狀說

鎮帶說

產椅說

流產崩漏分別

難產說



臍帶說

變胎說

整胎術

驗胎轉動并治術

陰門腫說

姙娠腫滿

水血漏下

臨產腰痛說

男女說

死胎并治方

逆孕說

姙娠次第說

姙娠忌法

乳汁說

胎受養說

姙娠候法說

姙娠日數

姙娠胎位說

產科指南目錄

文政癸未夏四月 上總 大牧周西撰

氏ノ忠臣ニ非スヤ此深ク志ス所ナリ  
力僕又和シテ以テコレヲ天下ニ擴充セハ豈賀川  
イハ衆人ニ是ヲ見サルカ抑見テ用ル能ハサル  
ニ就シム此事賀川氏叮嚀ニ是ヲ教ヘ示スト  
難産ヲ作ス者モ今此法ヲ行ハバ忽チ難シ轉ノ安  
モ難産ナシ且此法婦人各自ラ行ヒ安シ假令明日



身整胎ノ法ヲ得テ其身ヲ保護セハ千百人二一人  
ト謂フハ貴賤トナシ貧富トナク孕タル者自  
内ニ轉復セハ母ノ臍豈傷ラサルヘクシヤ妄言  
ノ言ニ胎子腹内ニ轉復スルノ說アリ若シ孕胎腹  
科ヲ業トスル者ハ知ラヌバ有ヘカラス又世俗  
トハ是ナリ故ニ万物皆倒スルニ知ラス此  
シヤ世ノ人則正ヲ捨テ逆ヲ取リ一盲衆ヲ牽ク  
明ニ向テ足ヲ地ニ着ク是正位ニアルヲ何  
陽トシ陰戸ノ内ヲ地トシ陰トス然ハ孕胎頭ヲ天  
中ニ渾然タル胚暉ヲ孕ム而シ陰戸ノ外ヲ天トシ

形タルヤ横骨ヨリ鳩尾ニ及テ是ヲ天圓ニ比入  
符合ス僕又密ニ胎孕ノ化ヲ理ヲ按スルニ夫孕婦ノ  
二諳厄利亞國孕婦ノ説ヲ即賀川氏ノ説ト暗ニ  
ノ如キハ產論翼ニ至テ審ナリ又解體新書ヲ覽ル  
ノ世ヲ誣ス實ニ此道ノ達識ナルヲ知ル手術  
讀コト數ト數百遍又孕婦ヲ試ル事數百人愈賀川氏  
ヤ是ニ於テ僕憤然ト志ヲ勵シ更ニ產論ヲ取テ  
大都ノ人スヲ猶且然リ矧ヤ寒郷ノ愚夫ニ於テ  
ヤ數百歲ノ疑城ニ此ヨリ破リ難キハナシ通邑  
ノ人ニレテ焉ソ倒ニ孕ノ理ヲシヤト嗚呼此事



ナルヲ覺テ或曰ク夫頭ヲ天ニシ足ヲ地ニスル  
カラス始テ賀川氏ノ所説顯然トシテ指下ニ明白  
其腹ヲ按シ其孕ヲ探ラサルハナシ其數舉テ計ヘ  
隣里近郷ニ胎孕ノ者ヲハ富トナク貧キトナク  
二鳴ル僕嘗テ其所著ノ産ヲ論シ事實ニ親ク試ニ  
シ賀川氏ナル者アリ此科ニ委ク其術ヲ以テ都下  
ヲ殞ス者ヲルシ見テ慨然トシ痛惜スルコトアリ昔  
殺麥ヲ辨セスルトヘ氏僻地ノ婦人産難ノ爲ニ命  
僕ヤ上總之鄙邑ニ生レ況ヤ不中不才ニソ固ヨリ  
産科指南自序

蒞庭擬于存誠藥室

文政兩成臯日吉東都丹彼元堅  
世書併以及此云

裕其精則庶幾無弊之弊矣既序  
世之修內科者咸如翁之於產科以



苟且以冀僥倖焉呼世豈道也哉使  
用心深沉志有未易遽窺者故陸  
是如用藥施治者其精粗人難辨  
其乃香人易辨用心淺深而  
尚乎哉抑予有感焉凡學術瘡疾者  
確非尋常文夫可企及世豈可嘉  
而令後刊此書以貽世其志之  
序保祐能繼翁學以其技行于都下


遂指贊村梓乃以其師遺命屢促而  
女身子森崎保祐深慨師說之就低  
捷徑志足見其志映樹矣翁既沒  
賀川氏之所未及殤切祥悉為陸生  
持來示予披褰讀之其文雖野間叢  
曩日嘗錄次所得著種指南二卷  
出新意乃不失一蓋殆至妙者矣  
為而翁之術日以加精奇患險證率



賴其金匱四方傳聞乞治者日益以益  
不下者盡莫不隨手奏功旣是一鄉  
胎之悉斜者上冲者橫者送者已死  
既索為廢寢食方有埋金乃嘗試之  
求師不得因取貧川氏子素潛思  
鄉無良醫為以產難斃遂有志救活  
上總大牧狗周西世為軍心早歲憐

序

東原先生集





官路 官崎 立元 擬

政丙戌初夏

則友人丹波君序中盡之矣  
乃略其意以識卷端如左  
詳  
謂十室之室忠信周西其人矣哉  
得之者以成于陋巷之士者所



都下好此技者定少矣哉而每  
術可口受而不可筆記也嗚呼  
產科指南唯不載其所為者此  
余屬集其經而錄之名曰  
醫中之一術以此救人亦寡  
孕婦易產是難定之說也雖則



其術曰妊娠三十日而決之令  
之枚脩產科之術而其精過之  
言也上經大收西經賀川氏  
藍冰水為之而寒於水減乎此  
荀蘭陵曰青取之於藍而青於  
產科指南序






關柳堂藏

產科指掌

上經大牧園西著





產科指南